

Μέση ποσότητα λιπάσματος που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια ενός στρέμματος¹

Λαχανοκομικό είδος	Χημική λίπανση (κιλα/στρέμμα)	
	Βασική ²	Επιφανειακή
Λάχανο	N 10-12 P ₂ O ₅ 5-7 K ₂ O 10-15	N 4-5 Στο στάδιο σχηματισμού της ροζέτας P ₂ O ₅ 3-5 Στο στάδιο σχηματισμού της κεφαλής K ₂ O 2-3 Μετά το σχηματισμό της κεφαλής
Λαχανοκομικό φασόλι	N 5-15 P ₂ O ₅ 15-20 K ₂ O 10-20	-
Μελιτζάνα	N 2,5-5,0 P ₂ O ₅ 20-30 K ₂ O 7,5-10	N 2,5-5,0 K ₂ O 7,5-10 Σε 2-3 δόσεις μετά από κάθε συγκομιδή
Μπάμια	N 6-8 P ₂ O ₅ 10-15 K ₂ O 8-10	N 8-10 K ₂ O 4-6 Σε 2-3 δόσεις μετά την καρπόδεση
Μπιζέλι (αρακάς)	N 3-6 P ₂ O ₅ 6-12 K ₂ O 6-15	-
Πεπονιά	N 7,5-10 P ₂ O ₅ 10-15 K ₂ O 20-25	N 7,5-10 Όταν αρχίσουν να αναπτύσσονται οι βλαστοί 2 ^{ης} τάξης
Πιπεριά	N 6-8 P ₂ O ₅ 8-10 K ₂ O 8-10	N 5-6 K ₂ O 3-5 Σε δόσεις μετά από κάθε συγκομιδή
Σπανάκι	N 5-8 P ₂ O ₅ 3-5 K ₂ O 15-20	N 10-12 Σε δόσεις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών
Τομάτα	N 5-10 P ₂ O ₅ 15-20 K ₂ O 10-12,5	N 5-10 K ₂ O 10-12,5 Σε δόσεις μετά από κάθε συγκομιδή

¹Η ποσότητα λιπάσματος είναι ενδεικτική. Για την ορθότερη εφαρμογή της λίπανσης (προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόμηση χρημάτων) συστήνεται να προηγείται εδαφολογική ανάλυση

²Πριν ή κατά τη σπορά/μεταφύτευση